



Verdens delirumdag - 15.mars 2023

QUIZ for helsepersonell

Spørsmål	Riktig	Galt
Delirium utvikles over mange måneder		
Delirium skyldes ofte akutt sykdom, skade eller kirurgi		
Oppmerksomhetstesting er sentralt i diagnostikken av delirium		
Psykologisk stress (eks. endrede omgivelser) kan utløse delirium		
Medikamentbivirkninger er aldri årsak til delirium		
Barn og unge voksne kan ikke få delirium		
Deliriumrisikoen er den samme uavhengig av alder		
Delirium er det samme som demens		
Demens er en sterk risikofaktor for delirium		
Delirium går vanligvis over etter noen få dager		
Delirium kan være svært plagsomt for pasienten		
Delirium øker ikke risikoen for senere behov for sykehjems plass		
Delirium øker muligens risikoen for senere utvikling av demens		
25 % av eldre sykehuspasienter får delirium		
Behandling av underliggende sykdom er viktig i behandlingen ved delirium		
Alt helsepersonell kan mer enn nok om delirium		
Å sikre bruk av høreapparater og briller er viktig i forebygging og behandling av delirium		
Adekvat smertelindring er et viktig tiltak i forebygging og behandling av delirium		
Benzodiazepiner er god behandling ved delirium		
Antipsykotika skal kun brukes ved plagsomme hallusinasjoner/psykosefenomener hos pasienter med delirium		