



## Verdens delirumdag – 12. mars 2025

### QUIZ for helsepersonell

| Spørsmål  | Riktig | Galt |
|---|--------|------|
| Delirium utvikles over mange måneder  |        |      |
| Delirium skyldes oftest akutt sykdom, skade eller kirurgi   |        |      |
| Oppmerksomhetstesting er sentralt i diagnostikken av delirium   |        |      |
| Medikamentbivirkninger er aldri årsak til delirium  |        |      |
| 4 AT bør brukes i diagnostikken av delirium   |        |      |
| CAM-ICU bør brukes rutinemessig på intensivavdeling   |        |      |
| Barn og unge voksne kan ikke få delirium  |        |      |
| Deliriumrisikoen er den samme uavhengig av alder  |        |      |
| Delirium er det samme som demens  |        |      |
| Demens er en sterk risikofaktor for delirium  |        |      |
| Delirium kan ikke forebygges  |        |      |
| Delirium går vanligvis over etter noen få dager   |        |      |
| Delirium kan være svært plagsomt for pasienten  |        |      |
| Delirium øker ikke risikoen for senere behov for sykehjemsplass   |        |      |
| Delirium øker muligens risikoen for senere utvikling av demens  |        |      |
| 25 % av eldre sykehuspasienter får delirium   |        |      |
| Behandling av underliggende sykdom er viktig i behandlingen av delirium                                       |        |      |
| Alt helsepersonell kan mer enn nok om delirium  |        |      |
| Å sikre bruk av høreapparater og briller er viktig i forebygging og behandling av delirium                    |        |      |
| Adekvat smertelindring er et viktig tiltak i forebygging og behandling av delirium                            |        |      |
| Benzodiazepiner er god behandling ved delirium  |        |      |
| Antipsykotika gjør at delirium går raskere over   |        |      |
| Antipsykotika kan vurderes ved plagsomme hallusinasjoner eller vrangforestillinger hos pasienter med delirium |        |      |